

EVALUAREA GLOBALĂ A CALITĂȚII AERULUI/ 2024

Poluarea atmosferică
a cauzat
8,1 milioane
de decese la nivel
mondial în 2021

Din anul 2000

numărul cazurilor de îmbolnăvire atribuite poluării aerului din locuință au scăzut considerabil datorită reducerii expunerii în China și Asia de Sud. Scăderea înregistrată fiind de 36%.

Poluarea aerului este responsabilă pentru:



30% din decesele cauzate de infecții ale căilor respiratorii inferioare



28% din decese din cauza bolii cardiace ischemice



48% din decese din cauza bolii pulmonare obstructive cronice

Cea mai mare povară a bolilor asociate poluării atmosferice este concentrată în Asia de Sud și în Africa.

Poluarea atmosferică ocupă locul al doilea în categoria factorilor de risc pentru mortalitate la nivel global:

1. Hipertensiunea arterială
2. Poluarea aerului
3. Tutunul
4. Regimul alimentar
5. Glicemie mărită

Raportul punctează vulnerabilitatea deosebită a copiilor sub 5 ani, printre efectele observate la nivelul sănătății numărându-se nașterea prematură, greutatea mică la naștere, astmul și bolile pulmonare. În 2021, expunerea la poluarea atmosferică a contribuit la peste 700.000 de decese în rândul copiilor sub 5 ani, devenind astfel al doilea factor principal asociat cu riscul de deces la nivel mondial pentru această grupă de vârstă, după malnutriție.



Factorii de risc globali pentru mortalitatea în rândul copiilor:

1. Malnutriție
2. Poluarea aerului
3. Apa, condiții sanitare, igienă
4. Temperatură ridicată sau scăzută
5. Tutun

