

Ulcerul piciorului diabetic este o complicație a piciorului diabetic și apare la aproape 15% din pacienții cu diabet. În cazul acestei afecțiuni, apar răni dureroase, care nu se vindecă, din cauza tulburărilor de metabolism. Disconfortul fizic și psihic sunt foarte mari și sunt cauzate de faptul că țesuturile sunt expuse în totalitate, favorizând apariția infecțiilor și a altor complicații.

Primele semne de instalare a ulcerului piciorului diabetic sunt modificările apărute la nivelul degetelor piciorului, sub formă de crăpături sau leziuni. Acestea pot exista și pe talpă, gleznă sau călcâi. Orice leziune, băătăură sau bășică trebuie analizate cu atenție, pentru că pot indica apariția acestei complicații.

Piciorul diabetic este periculos, deoarece ulcerațiile, infecțiile și cangrena pot duce la amputarea piciorului, în 80% din cazuri.

Poți evita riscul amputării piciorului dacă apelezi la o soluție inovatoare, disponibilă în cadrul **MEDICOVER**. Terapia se numește **ESWT** și este una dintre cele mai bune soluții de tratament existente pentru piciorul diabetic. Rezultatele terapiei cu unde de șoc sunt vizibile după primele ședințe, **rata de vindecare fiind foarte mare**.

Tratamentul prin tehnologia cu ultrasunete

Terapia cu unde de șoc este una dintre cele mai eficiente soluții existente la ora actuală pentru ulcerul piciorului diabetic. **Tratamentul prin ESWT** accelerează vindecarea rănilor și ale țesuturilor afectate de ulcerații, prin undele ultrasonice pe care le propagă.

Potrivit studiilor existente, acest tip de terapie pentru piciorul diabetic are o **rată de succes de peste 75%**, în cazurile de ulcer diabetic cronic ale

piciorului. **În numai câteva săptămâni, vindecarea ulcerelor este completă.** Dincolo de acest aspect, marele avantaj al terapiei ESWT este că nu există efecte adverse.

Durata tratamentului

Tratamentul constă în **5 ședințe** de terapie cu unde șoc. **Durata** tratamentului **variază** în funcție de cronicitatea afecțiunii și posibilele complicații existente. Rezultatele sunt vizibile după primele ședințe, iar vindecarea completă a plăgilor se poate realiza în numai câteva săptămâni.

Beneficiile tratamentului

- Total neinvaziv
- Fără durere
- Fără efecte secundare



PACHET ESWT PICIORUL DIABETIC

Tratament neinvaziv, nedureros
și fără efecte adverse

LAURA P - 63 ani

Diagnostic: Plagă postdecapare leziune necrotică retromaleolar stâng

Comorbidități: Arteriopatie și diabet tip II




Tratamentul a durat 1 lună până la vindecare.

ANONIM - 55 ani

Diagnostic: Plagă suprainfectată (arsura veche de 3 luni) antepicior drept de aprox 6/3 cm, durere locală, edem gleznă

Comorbidități: Diabet zaharat insulino-dependent



Tratamentul a durat 1 lună până la vindecare.

VASILE B- 70 ani

Diagnostic: Plagă suprainfectată planta antepicior stâng, afectare osoasă

Comorbidități: Diabet dezechilibrat tip II, obezitate, neuropatie diabetică



Tratamentul a durat 6 luni până la vindecare.

ANONIM - 51 ani

Diagnostic: Ulcer varicos suprainfectat retromaleolar stâng eritem gambier bilat, multiple leziuni de grataj

Comorbidități: Insuficiență venoasă cronică, stafilococ prezent pe gambe



Tratamentul a durat 1 lună până la vindecare.